Papilio Jordani Fruhstorfer ♀

(Nieuw voor de Fauna van Celebes)

door

P. J. VAN DEN BERGH LZN.

(Met plaat 14).

In de „Entomologische Zeitschrift", Central Organ des Int. Ent. Vereins, No. 10 van 8 Juni 1906, beschrijft de heer FRUHSTORFER van bovengenoemden vlinder het ♂, waarvan slechts 2 exemplaren bekend zijn van Zuid-Oost-Celebes. Zie ook SEITZ Fauna Indo-Australica Papilionidae, pag. 60.

Eenigen tijd geleden ontving ik van mijn verzamelaar uit Noord-Celebes een groote zending vlinders, waarbij zich een 4-tal ♂♂ bevonden, die geheel met de beschrijving en afbeelding van FRUHSTORFER overeenkomen, met dit verschil echter, dat de witte vlek op den thorax niet voorkomt, hetgeen niet als een specifiek verschil mag worden aangemerkt.

Behalve genoemde 4 ♂♂, was ik zoo gelukkig, ook 2 ♀♀ te ontvangen, welke tot heden onbekend zijn gebleven.

Zooals de heer FRUHSTORFER terecht veronderstelt, verschilt het ♀ sterk van het ♂ en is de soort dus sexueeldimorph. Het ♀ is iets grooter dan het ♂ en komt in grootte overeen met de bekende *Papilio memnon* L. De kleur is bruin-wit, waarin de aderen sprekend zwart uitkomen. In de groote cel der bovenvleugels staat aan het einde een bruinzwarte vlek, die naar beneden spits toeloopt en een streep vormt, die bijna den wortel raakt; aan beide zijden hiervan loopt nog een bruinzwarte streep, welke strepen met de middelste bij den wortel te samen komen.

Langs den buitenrand der bovenvleugels loopt een bruingrijze schaduwlijn, van waaruit tusschen de aderen in de

richting van den wortel pijlvormige bruin-grijze strepen loopen, die echter de onderste ader van de groote cel niet raken.

De ondervleugels zijn vanaf den wortel voor de helft wit, daarna bruin-grijs bestoven; waar het wit eindigt, ongeveer op de helft van de vleugel, staan, in een boogrij geplaatst, 6 pijlvormige zwartbruine vlekken, waarvan de punten wijzen in de richting van den wortel.

De buitenrand der ondervleugels is, evenals bij het ♂, gekarteld met witte en bruinzwarte insnijdingen.

In den staarthoek staat een ovale bruinzwarte vlek, van boven en beneden begrensd door geelwitte vlekken, bij het ♂ alleen door witte vlekken. In de middencel staan 3 bruingrijze streepjes, waarvan er één ontspringt in den wortel. Het achterlijf is geelachtig wit, van boven voorzien van een breede, zwarte streep, en opzij van 3 gebroken lengtestrepen, waarvan in de middelste een rij van witte puntjes.

De thorax is bruingrijs, waarover een zwarte streep, terwijl tusschen kop en thorax 6 witte haarbosjes geplaatst zijn.

De palpen zijn wit, de oogen bruinzwart.

Overeenkomstige kenmerken met het ♂ zijn witte palpen, bruinzwarte oogen, de 6 witte haarbosjes achter den kop, alsmede de witte vlekken langs den buitenrand der gekartelde ondervleugels.

Nog zij vermeld, dat het dier veel overeenkomst vertoont met *Hestia blanchardi* MARSH. ♀ eveneens van Celebes.

Vindplaats is Bolaäng Mongondou, Noord-Celebes.

In mijne collectie berusten 2 exemplaren.

PLAATVERKLARING.

Pl. 14. *Papilio jordani* FRUHST. ♂ en ♀,
natuurlijke grootte.

Tilburg, Januari 1920.